

surtout près des yeux, à peine fovéolée sur le front, subsinuée à la marge antérieure; labre grand, noir; palpes maxillaires relativement longs et épais, de trois articles, le dernier suboblong. Prothorax beaucoup plus rétréci en avant qu'à la base, présentant sa plus grande largeur vers le premier quart de la longueur à partir de la base, sensiblement aussi long que large dans sa plus grande largeur, éparsément et finement ponctué, faiblement sillonné dans la longueur, présentant de chaque côté, dans la région de l'angle postérieur, un lobe subcirculaire, subconvexe, enfermé par une strie; bord antérieur arqué en avant; bords latéraux arrondis; base trisinuée; angles antérieurs obtus, peu marqués, postérieurs aigus, un peu saillants en arrière. Écusson suborbiculaire, lisse dans le milieu. Élytres sensiblement aussi larges à la base que le prothorax, très faiblement dilatés dans la partie la plus large, subacuminés ensemble au sommet, environ un peu plus de deux fois plus longs que larges dans leur plus grande largeur, assez fortement striés-ponctués; stries ponctuées entières; intervalles plus larges que les stries, finement ponctués, presque subruguleux. Pattes assez robustes, tarses très allongés.

Chine : Yunnan (Rév. P. DUCLOUX). Collection A. GROUVELLE.

Nouvelles espèces de Coléoptères de Chypre et d'Asie Mineure

par Ch. ZURCHER.

Ophonus carteroides, n. sp. — *Elongatus, nigro-piceus, antennis pedibusque rufotestaceis, prothorace cordiformi, angulis posticis obtusis, tenuibus magnisque punctis medio parce impresso densius basin versus, elytris parallelis, elytrorum 6 interstitiis primis basin versus et medio punctis tenuibus magnisque impressis, apicem versus tenuiter denseque punctatis, ultimis interstitiis tenuiter denseque punctatis.* — Long. 12 mill.

Se rapproche par ses six premiers intervalles des élytres garnis de points fins et gros de l'*Ophonus oblongus* Schaum, mais est beaucoup plus petit, les gros points sont notablement plus gros que ceux de l'*O. oblongus*. Cette ponctuation particulière et sa forme parallèle lui donne un peu l'aspect d'un *Carterus*, d'un intermédiaire entre les *Carterus* et les *Ophonus*.

La tête est ponctuée comme l'est celle de l'*O. oblongus*, mais le thorax est bien plus fortement ponctué; outre les points fins répandus sur toute la surface et peu serrés, on trouve de gros points assez serrés à la base et plus écartés sur le reste du thorax; ces points ont tendance à se grouper en lignes séparées les unes des autres. Ces gros points comme ceux des élytres donnent naissance à une soie claire couchée et dirigée en arrière. Les épipleures sont rouges, ils sont noirs chez *O. oblongus*.

Un spécimen d'Adana (Asie Mineure).

Coroebus cyprius, n. sp. — *Curtus, conveys, granulato-punctatus, pube albida subsericeus, capite medio profunde canaliculato, thorace medio gibbo oblique biimpresso, prosterno antice acuminato, abdominis ultimo segmento haud impresso.* — Long. 3.1-2-5.1-2 mill.

Court, très convexe, bronzé, peu brillant; pubescence blanche moyenne, ponctuation en dessus forte et granuleuse réunie par des rides transversales. Tête très convexe à sillon médian profond et entier, à pubescence plus longue par devant et à cet endroit, partant du sillon pour se diriger vers les côtés en formant une petite touffe blanche. Ponctuation simple et assez espacée au milieu, plus dense et ne formant des rides que sur les côtés. Antennes dentées à partir du 5^e article. Thorax aussi large à la base qu'au sommet régulièrement arrondi sur les côtés, un peu plus large que les élytres à leur base avec la moitié antérieure des côtés droite, l'autre moitié formant une courbe concave allant jusqu'à l'angle postérieur qui est obtus. Écusson transversal, large et à sommet prolongé en mince pointe. Élytres courts s'élargissant d'une façon marquée après le milieu, à calus saillant et lisse. Abdomen à ponctuation écartée, à pubescence blanche fine un peu condensée à l'extrémité du dernier segment qui n'est pas impressionné. L'extrémité du métasternum est garnie d'une ligne de pubescence blanche. Deux petites taches blanches contiguës de poils plus forts et plus serrés sont situées à l'extrémité épisternale du métathorax et au côté externe des haanches de la troisième paire de pattes; en outre une autre tache blanche allongée se voit sur la partie externe visible du cinquième segment dorsal de l'abdomen. Mentonnière échancrée. Extrémité du prosternum en pointe aiguë.

Plusieurs individus des environs de Nicosie (île de Chypre).

Anoxia cypria, n. sp. — *Elongata, capite abdomineque nigris, clypeo, antennis, prothorace, pedibus, abdominis ultimo segmento pygidioque rufescentibus, elytris brunneo-flavescentibus, capite prothoraceque infra, capite scutelloque supra, longe albido-cinereo pubescentibus,*

prothorace elytrisque breviter tenuiterque fulvo pubescentibus, duabus lineis in elytris densius pubescentibus, pygidio sat profunde emarginato. — Long. 24 mill.

Bord antérieur de l'épistome droit, dans le milieu un peu convexe. Épistome ayant quelques poils couchés plus courts et jaunes par devant, plus longs et cendrés en arrière. Tête à pubescence cendrée, longue et fournie peu dressée. La pubescence du thorax est jaune, éparse, assez uniforme, un peu plus serrée sur les côtés. La pubescence des élytres est la même que celle du thorax, un peu plus claire, et forme deux lignes de taches de poils plus serrés et un peu plus longs; une de ces lignes le long de la suture, l'autre dans la dépression latérale. La pubescence du pygidium est fine, courte et peu fournie. Les élytres sont bordés à la base d'un contour noir. Le pygidium est rouge, contourné de noir et est en outre marqué de trois lignes noires partant de la base, une au milieu et les deux autres obliques des côtés. L'abdomen est garni de fines squamules blanches et a sur les côtés les taches triangulaires habituelles.

Un mâle des environs de Nicosie (île de Chypre).

Danacea ciliciensis, n. sp. — *Ovata, sat nitida, nigro-avenae vel viridis, supra parce griseo pubescens, pube squamosa subtili brevique, antennis pedibusque rufo testaceis, illis apice nigricantibus, palpis nigris, fronte plana, biimpressa, prothorace basi et apice latitudine aequali, squamulis aequaliter dispositis, elytris thorace multo latioribus, valde marginatis, distincte punctatis, callo humerali valido.* — Long. 3,5-3,7 mill.

♂. *Thorace latitudine paulo longiore, lateribus angulatim ampliatis, capite cum oculis thorace vix latiore, antennis robustis, serratis.*

♀. *Thorace latitudine haud longiore, lateribus vix ampliatis, capite cum oculis fere angustioribus, antennis gracilioribus brevioribusque, apicem versus haud validioribus.*

Ressemble beaucoup à *D. cypria* Schilsky, surtout par le bord des élytres large et plan, mais en diffère par sa taille plus grande, la vestiture des élytres bien plus clairsemée (chez le *D. cypria*, elle est variable et souvent assez dense et jaunâtre), par le corselet plus allongé et surtout par la conformation différente des antennes.

Le mâle est de la même forme que la femelle, ses élytres s'élargissent de la même manière; les bords du corselet sont droits dans les deux sexes; chez le mâle, au milieu des côtés, il y a un tubercule bien marqué, ce tubercule est obtus chez la femelle. Les trois premiers articles des antennes sont jaunes, les quatre suivants de plus en plus

tachés de noir. les derniers noirs à pédoncule jaune chez le mâle. Elles sont longues, robustes et dentées à partir du 3^e article chez le mâle, les articles 9 et 10 plus coniques et un peu plus longs que larges, l'article 11 est allongé presque aussi long que 9 et 10 ensemble, 3 et 4 plus longs que larges, 5, 6, 7 et 8 un peu plus larges que longs. Les antennes de la femelle sont minces, sans s'élargir notablement vers l'extrémité et beaucoup plus courtes, à peine dentées, le 3^e article seul un peu plus long que large.

Quelques spécimens de Hadjin-Dagh (Taurus de Cilicie).

Description d'un *Halobatinae* paléarctique [HEM. GERRIDAE]

par E. BERGROTH.

Naboandelus Bergevini, n. sp. — *Oratus*, latitudine sua triplo (♂) aut paullo plus quam duplo (♀) longior, opacus, mesonoto medio nitidulo, supra remote breviter suberecte pilosus, in lateribus mesonoti densius pilosulus, supra niger, subtus caesius, pronoto, vittis duabus latis percurrentibus retrorsum divergentibus mesonoti, metanoto abdomineque superne plus minusve cinereo-pruinosis, capite subtus et lateribus margineque ejus laterali superiore secundum orbitam oculorum usque ad basin continuato ac macula basali subquadrata pronoti medium ejus superante flavolestaceis, interdum cinerascentibus, acetabulis anticis livido-testaceis, margine apicali sequenti ultimi dorsalis feminae ac ventre feminae pallide ochraceis, hoc tantum medio caesio, antennis et pedibus nigris, rostro (articulo ultimo nigro excepto), trochanteribus plerumque et femoribus anticis mediisque basin versus interdum flavescentibus. Caput transversale, e supero visum ante oculos per spatium breve parallelum, deinde triangulariter breviter productum, unguo faciali subrecto, e latere visum antrosum convexo declive, apice rotundatum, parte antoculavi parte interoculavi distincte brevior, oculis majusculis sed modice prominulis, antrosum convergentibus, e supero visis latitudine sua multo longioribus, e latere visis subrotundis, gulam at non planum superius verticis attingentibus, orbita superiore subrotundato-truncata, antennis dimidio corporis nonnihil longioribus, articulo primo capite paulo longiore et articulis duobus sequentibus unitis nonnihil brevior, basin versus sat fortiter